

PIÉTIN



C'est une **infection douloureuse**, causée par une **bactérie** qui survit peu de temps dans le milieu extérieur (sauf sur les prairies richement fertilisées et les sols neutres ou alcalins). Elle est due au **développement des bactéries**, en **l'absence d'oxygène** et atteint les **espaces entre les onglons**.

TRANSMISSION

Elle se fait dans les pâtures ou les litières contaminées. L'humidité, la saleté et les lésions sur les onglons, facilitent sa circulation.

SYMPTÔMES

Au début de l'affection, on peut observer une **rougeur** de l'espace interdigité, qui évolue en **pourrissement** de l'onglon, qui finit par se **nécroser** et tomber.

Souvent les animaux touchés restent **couchés** et leur **production chute**.

C'est une des **principales causes de boiterie** en élevage ovin.



LES MOYENS DE LUTTE


Sanitaire :

- **Surveillance** et **entretien** régulier des **onglons**
- Mise en **quarantaine** des animaux introduits sur l'exploitation
- **Réforme** des animaux infectés chroniques (cause **génétique**)

Médicale :

- **Pédiluve** (sulfate de zinc à 15%, 15 minutes, 15cm d'eau. Ne pas oublier de passer les brebis dans un bac de lavage avant la parage et d'aménager une aire d'égouttage après le bac de stationnement)
- **Vaccination**



 **Après la nécrose des onglons, le stade d'infection est irréversible.**

Pour plus d'information

Contactez le GDS 46 au 05.65.23.22.08