



NEWS

Retour de la FCO 3 dans le Lot


La situation sanitaire vis-à-vis de la FCO-3 évolue rapidement dans le département du Lot. Ces 15 derniers jours, 43 foyers ont été déclarés, dont 37 foyers ovins et 6 foyers bovin. Les animaux les plus fréquemment touchés sont les agnelles, antenaises et béliers. Toutefois, la vigilance doit rester maximale sur les bovins également. Dans ce contexte, pour l'ensemble des élevages, confrontés ou non à des cas cliniques, il est fortement recommandé de **renforcer l'immunité des animaux**. Pour cela, une **complémentation en iode, sélénium et vitamine E** aidera les troupeaux face à l'infection. Il est conseillé d'intervenir dès maintenant afin d'optimiser les capacités de réponse immunitaire des troupeaux pendant cette période à risque.

Concernant la vaccination, qui doit être anticipée pour permettre une protection efficace, il est conseillé de se rapprocher de son vétérinaire. Celui-ci est aussi à contacter en cas de suspicion clinique afin de poser un diagnostic et d'assurer un suivi de la situation épidémiologique dans le département. **Pour confirmer un foyer, l'analyse PCR reste l'examen de référence** et pourra aussi servir si des aides se débloquent pour indemniser les pertes.


ACTU LOT : CARTOGRAPHIE FCO 3 2025/2026

A ce jour, 21 juillet, le nombre de foyers FCO 3 a atteint le nombre de foyers comptabilisés en fin d'année 2025. Toutefois, la répartition spatiale est différente et se déplace vers l'est du département.

Répartition des 42 foyers FCO-3 au 31/12/2025



Répartition des 43 foyers FCO-3 au 21/07/2026



Ce décalage nous montre que les animaux développent bien une immunité contre la maladie, à condition tout de même qu'on les supplémente en minéraux et oligo-vitamines pour renforcer le système immunitaire.

STRONGLES DIGESTIFS : QU'ES AQUO ?

Les **strongles digestifs** sont des vers parasites présents dans la caillette et les intestins des ruminants. La contamination se fait par ingestion de larves présentes sur l'herbe. En bovin, les veaux et les génisses, sont les plus sensibles. Une infestation importante peut entraîner des pertes de croissance significatives. En élevage ovin, ils représentent l'une des principales causes de baisse de performances chez les agneaux et les brebis.


Les **symptômes** varient selon l'espèce de strongle et l'intensité de l'infestation, mais les manifestations les plus fréquentes sont :

- Amaigrissement, baisse de production laitière, diarrhée plus ou moins importante, anémie (muqueuses pâles, 3e paupière blanchâtre), oedème sous-mandibulaire (« signe de la bouteille »)
- Laine ou toison de mauvaise qualité, poil piqué, aspect terne du pelage
- Dans les cas graves : mortalité

Le **risque est particulièrement élevé lors des périodes humides et tempérées**, notamment à la fin du printemps et à l'automne.

Le diagnostic repose sur l'examen clinique et les analyses coprologiques, notamment en début d'été. De plus en plus, des résistances aux traitements apparaissent. Pour s'assurer que le produit utilisé est efficace, il est préférable de faire une analyse coprologique 15 jours après traitement.

Sur envoi de facture, le GDS vous rembourse 50% des frais d'analyses réalisées chez Public Labo.



CONSEIL DU MOIS

Analyser ses fourrages, le point de départ de vos rations

Les fourrages représentent 50 à 100% de la ration, il est donc indispensable de connaître leur composition (énergie, protéines, minéraux, fibres) pour ajuster au mieux la complémentation.

Pour prélever vos échantillons, il est préférable d'utiliser une carotteuse afin de sonder plusieurs bottes et d'avoir ainsi un prélèvement le plus représentatif possible. Ensuite, il faut amener ou envoyer les prélèvements au laboratoire et **demandeur une analyse des valeurs alimentaires ET minérales**.

Pourquoi les valeurs alimentaires ? Ces indications permettent d'ajuster au mieux l'équilibre énergie/protéine de la ration afin de maintenir une bonne production des animaux.

Pourquoi les valeurs minérales ? Pour trier ses fourrages selon les teneurs minérales et pour ajuster au mieux le minéral apporté aux animaux en calcium, phosphore, magnésium et oligo-éléments. En effet, certains excès ou carences peuvent être contre productifs. Par exemple, des fourrages trop riches en potassium en fin de gestation peuvent augmenter le risque de prolapsus et de mauvaises dilatations. Cette analyse permet aussi de vérifier l'absence de métaux lourds qui sont très inflammatoires et entraînent des blocages métaboliques.

Enfin, l'analyse minérale permet de mieux raisonner la fertilisation des prairies dans le but d'améliorer la qualité des fourrages.

Investir dans une analyse de fourrages complète, c'est investir pour la bonne santé de ses animaux.



Public Labo propose des analyses de fourrages avec valeurs alimentaires et minérales à **RAPPEL : 47,50€ l'analyse** (le restant, 50%, est pris en charge par le Conseil Dépt. 46).

Vous trouverez les bordereaux d'analyses sur le site internet de Public Labo ou auprès du GDS.