

# VISNA MAËDI



C'est une maladie **virale**, causée par un **lentivirus** (la même famille que celle du CAEV chez les caprins et du VIH chez les humains).

## TRANSMISSION ET CONTAMINATION DU TROUPEAU

*Voie orale* : par ingestion du **colostrum** ou du **lait** de mère contaminée

*Voie mammaire* : lors de la **traite** (phénomène d'impact du lait)

*Voie sanguine ou respiratoire* : dans les cheptels où les **conditions d'hygiène sont médiocres** (contact direct) et où on observe des **symptômes respiratoires** ou en cas d'utilisation **d'une seule aiguille** pour plusieurs individus.

## LES SYMPTÔMES

On peut observer :

- Un **amaigrissement**
- Des **pneumonies** sans toux ni jetage (animaux > 24 mois)
- Une **baisse de la sécrétion lactée** sans modification de l'aspect du lait
- Des **symptômes nerveux** (démarche chancelante, puis paralysie et spasmes)

## LE DIAGNOSTIC

Il est plus intéressant de faire un **dépistage de groupe** afin de connaître la **séroprévalence** au sein de son troupeau.

Outre le diagnostic clinique, il est possible de faire des recherches **sérologiques** (recherche d'anticorps).

La recherche sérologique peut porter sur les **animaux de plus de 6 mois**, et le nombre à prélever dépendra de la taille du lot ou du troupeau.

## LES MOYENS DE LUTTE

Il n'y a **pas de traitement, ni de vaccin**.

L'objectif dans un cheptel infecté, est de maîtriser les cas cliniques (en fonction de la séroprévalence du troupeau) :

- **Suivis sérologiques réguliers**
- **Séparation** dès la mise bas
- **Thermisation** du colostrum et thermisation ou **acidification** du lait
- **Réforme** des animaux cliniquement atteints
- Soigner son **hygiène de traite** (primipares au 1<sup>ère</sup> par exemple)

Pour plus d'informations

Contactez le GDS 46 au 05.65.23.22.08

